

CONSENTEMENT ECLAIRÉ – LA BLÉPHAROPLASTIE

Daniel Durand MD, FRCS, FACS 514-737-6100
1600 avenue du Boisé, # 112, Montréal, Qc, CANADA

Le consentement éclairé a été préparé pour vous informer de LA BLÉPHAROPLASTIE, ses avantages, ses inconvénients, ses risques, ainsi que sur les traitements alternatifs. Il est important que vous lisiez ces informations attentivement et au complet. Veuillez apposer vos initiales sur chaque page, indiquant que vous avez lu la page et en signant le consentement de la chirurgie proposée par votre chirurgien plasticien que vous acceptez en pleine connaissance de cause.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LES INDICATIONS

La blépharoplastie est une intervention chirurgicale visant à enlever l'excès de peau et de muscle des paupières supérieures et / ou inférieures ainsi que du tissu adipeux sous-jacent. La blépharoplastie peut améliorer la peau tombante et les poches. Cela peut aider à améliorer la vision chez les patients qui ont une paupière supérieure tombante. La blépharoplastie ne supprime pas la "patte d'oie" ou d'autres rides, n'élimine pas les cernes sous les yeux et ne lève pas les sourcils affaissés ni les joues.

TRAITEMENTS ALTERNATIFS

Les formes alternatives de gestion incluent le traitement non chirurgical de la laxité de la peau et des poches dans les paupières. L'amélioration de la laxité de la peau, des dépôts graisseux et des rides de la peau peut être obtenue par d'autres traitements ou d'autres interventions chirurgicales telles qu'un lifting des sourcils, le cas échéant. Si vous avez des troubles du fonctionnement de la paupière tels que des paupières tombantes dues à des problèmes musculaires (ptosis des paupières) ou un relâchement entre la paupière et le globe oculaire (ectropion), d'autres types de chirurgie des paupières peuvent être nécessaires. Les rides mineures de la peau peuvent être améliorées par le resurfaçage ou d'autres traitements cutanés. Les risques et les complications possibles sont associés à d'autres formes de traitement.

RISQUES GÉNÉRAUX DE LA CHIRURGIE POUR LA BLÉPHAROPLASTIE

Chaque intervention chirurgicale implique un certain niveau de risque et il est important que vous compreniez ces risques et leurs complications éventuelles. De plus, chaque procédure a ses limites. Le choix d'une personne de subir une intervention chirurgicale est fondé sur la comparaison du risque d'un bénéfice potentiel. Bien que la majorité des patients ne présente pas ces complications, vous devez en discuter avec votre chirurgien plasticien pour vous assurer de bien comprendre toutes les conséquences possibles d'une plastie abdominale.

Saignement - Il est possible, bien qu'inhabituel, d'avoir un épisode de saignement pendant ou après une opération de blépharoplastie. Des saignements peuvent survenir sous la peau ou à l'intérieur du globe oculaire. Si vous présentez un saignement postopératoire, un traitement d'urgence ou une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Ne prenez pas d'aspirine ni d'anti-inflammatoires pendant dix jours avant une intervention chirurgicale, car cela pourrait accroître le risque de saignement. L'hypertension (hypertension artérielle) qui n'est pas sous contrôle médical peut provoquer des saignements pendant ou après la chirurgie. Les accumulations de sang sous les paupières peuvent retarder la guérison et causer des cicatrices.

Infection - L'infection est très rare après une chirurgie. En cas d'infection, un traitement supplémentaire incluant des antibiotiques peut être nécessaire.

Initiales du patient _____

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ - LA BLÉPHAROPLASTIE

RISQUES GÉNÉRAUX DE CHIRURGIE DE LA BLÉPHAROPLASTIE (suite)

Anesthésie chirurgicale - L'anesthésie locale et l'anesthésie générale comportent un risque. Toutes les formes d'anesthésie ou de sédation chirurgicales peuvent entraîner des complications, des blessures et même la mort.

Réactions allergiques: Dans de rares cas, des allergies locales au ruban adhésif, au matériel de suture, aux préparations topiques ou aux agents injectés ont été rapportées. Des réactions systémiques graves, notamment un choc (anaphylaxie), peuvent survenir en réponse aux médicaments utilisés pendant la chirurgie et aux médicaments sur ordonnance. Les réactions allergiques peuvent nécessiter un traitement supplémentaire.

Décoloration de la peau / gonflement: Des ecchymoses et un gonflement se produisent normalement. La peau à l'intérieur ou à proximité du site chirurgical peut apparaître plus claire ou plus sombre que la peau environnante. Bien que rare, l'enflure et la décoloration de la peau peuvent persister pendant de longues périodes et, dans de rares cas, être permanentes.

Thrombose veineuse et séquelles: Les veines thrombosées, qui ressemblent à des cordons, se développent parfois au niveau des jambes ou autour des sites intraveineux et se résolvent généralement sans traitement médical ou chirurgical. Il est important de discuter avec votre chirurgien des pilules contraceptives que vous prenez. Certaines pilules à haute teneur en œstrogène peuvent augmenter votre risque de thrombose veineuse.

Guérison différée: Toutes les interventions chirurgicales peuvent entraîner une rupture de la plaie ou une cicatrisation retardée. Certaines zones de la peau peuvent ne pas guérir normalement et peuvent mettre longtemps à guérir. Les personnes dont l'apport sanguin aux tissus est réduit lors d'une intervention chirurgicale ou d'une radiothérapie antérieures peuvent présenter un risque accru de cicatrisation et de mauvais résultat chirurgical. Les fumeurs courent un plus grand risque de perte de peau et de complications de cicatrisation.

Domages causés aux structures plus profondes: il existe un risque de blessure des structures plus profondes, notamment des nerfs, des vaisseaux sanguins, des muscles, lors de toute intervention chirurgicale. Le potentiel pour que cela se produise varie selon le type de procédure en cours d'exécution. Les dommages aux structures plus profondes peuvent être temporaires ou permanents.

Thrombose veineuse profonde, complications cardiaques et pulmonaires - La chirurgie, en particulier les interventions plus longues, peut être associée à la formation de caillots sanguins ou à l'augmentation de ceux-ci dans le système veineux. Des complications pulmonaires peuvent survenir secondairement à la fois à des caillots sanguins (embolies pulmonaires), à des dépôts adipeux (embolies graisseuses) ou à un collapsus pulmonaire après une anesthésie générale. Les embolies pulmonaires et adipeuses peuvent être fatales ou fatales dans certaines circonstances. Les voyages aériens, l'inactivité et d'autres facteurs peuvent augmenter l'incidence des caillots sanguins se dirigeant vers les poumons, entraînant un caillot sanguin important pouvant entraîner la mort. Il est important de discuter avec votre médecin de vos antécédents de caillots sanguins, de jambes enflées, d'utilisation d'œstrogènes ou de pilules contraceptives pouvant contribuer à cet état. Les complications cardiaques sont un risque avec toute intervention chirurgicale et anesthésie, même chez les patients ne présentant pas de symptômes. Si l'une de ces complications devait survenir, une hospitalisation et un traitement supplémentaire pourraient être nécessaires.

Si vous ressentez un essoufflement, des douleurs à la poitrine ou des battements de coeur inhabituels, consultez immédiatement un médecin.

Résultat insatisfaisant - Bien que de bons résultats soient attendus, il n'y a aucune garantie, explicite ou implicite, sur les résultats pouvant être obtenus. Vous pourriez être déçu des résultats de la blépharoplastie. Cela inclurait des risques tels que l'asymétrie, une cicatrice chirurgicale peu satisfaisante ou très visible, des déformations visibles inacceptables, des plis et des ondulations cutanées près des lignes de suture ou aux extrémités des incisions (oreilles de chien), une mauvaise cicatrisation, la rupture de la plaie et de sensation. Il peut ne pas être possible de corriger ou d'améliorer les effets des cicatrices chirurgicales. Dans certaines situations, il peut ne pas être possible d'obtenir des résultats optimaux avec une seule intervention chirurgicale. Une intervention chirurgicale supplémentaire peut être nécessaire pour améliorer les résultats.

Initiales du patient _____

Page 2 de 7

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ- LA BLÉPHAROPLASTIE

RISQUES SPECIFIQUES DE L' BLÉPHAROPLASTIE

Cicatrices - Bien qu'une bonne cicatrisation des plaies après une intervention chirurgicale soit attendue, des cicatrices anormales peuvent apparaître à la fois dans la paupière et les tissus plus profonds. Dans de rares cas, des cicatrices anormales peuvent en résulter. Les cicatrices peuvent être peu attrayantes et d'une couleur différente de celle de la peau environnante. Il existe un risque de marques visibles sur la paupière ou de petits kystes cutanés dus aux sutures. Des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires pour traiter les cicatrices.

Dommages causés aux structures plus profondes - Les structures plus profondes telles que les nerfs, les vaisseaux sanguins et les muscles des yeux peuvent être endommagés au cours de la chirurgie. Le risque que cela se produise varie selon le type de blépharoplastie réalisée. Les dommages aux structures plus profondes peuvent être temporaires ou permanents.

Problèmes de sécheresse oculaire - Des troubles permanents entraînant une diminution de la production de larmes peuvent survenir après une blépharoplastie. Sa survenue est rare et pas tout à fait prévisible. Les personnes qui ont normalement les yeux secs peuvent être avisées de faire preuve de prudence lorsqu'elles envisagent une blépharoplastie.

Asymétrie - Le visage humain et la région de la paupière sont normalement asymétriques. Il peut y avoir une variation d'un côté à l'autre après une blépharoplastie.

Douleur chronique - La douleur chronique peut survenir très rarement après une blépharoplastie.

Troubles cutanés / cancer de la peau - Une blépharoplastie est une intervention chirurgicale destinée à resserrer la peau lâche et les structures plus profondes de la paupière. Les troubles cutanés et le cancer de la peau peuvent survenir indépendamment de la chirurgie des paupières.

Ectropion - Le déplacement de la paupière inférieure loin du globe oculaire est une complication rare. Une intervention chirurgicale supplémentaire peut être nécessaire pour corriger cette condition.

Problème d'exposition cornéenne - Certains patients ont des difficultés à fermer leurs paupières après une intervention chirurgicale et des problèmes peuvent survenir dans la cornée en raison de la sécheresse. Si cette complication rare devait survenir, des traitements supplémentaires ou une intervention chirurgicale et un traitement pourraient être nécessaires.

Cécité - La cécité est extrêmement rare après une blépharoplastie. Cependant, elle peut être causée par une hémorragie interne autour de l'œil pendant ou après la chirurgie. Son occurrence n'est pas prévisible.

Perte de cheveux dans les cils - La perte de cheveux peut survenir dans la zone des cils inférieurs où la peau était surélevée pendant la chirurgie. Son occurrence n'est pas prévisible. La perte de cheveux peut être temporaire ou permanente.

Résultats à long terme - Des altérations ultérieures de l'apparence des paupières peuvent survenir à cause du vieillissement, de l'exposition au soleil, de la perte de poids, de la prise de poids, de la grossesse, de la ménopause ou d'autres circonstances non liées à votre chirurgie. De plus, il est possible que certaines séquelles de votre état persistent et / ou se reproduisent après votre chirurgie et cela peut nécessiter une évaluation et un traitement plus poussés dans diverses spécialités, notamment la chirurgie plastique. La blépharoplastie n'arrête pas le processus de vieillissement et ne provoque pas de resserrement permanent de la région des paupières. Une future intervention chirurgicale ou d'autres traitements peuvent s'avérer nécessaires pour maintenir les résultats d'une blépharoplastie.

Initiales du patient _____

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ – LA BLÉPHAROPLASTIE

CONSEILS ADDITIONNELS

Usage du tabac, exposition à la fumée secondaire, produits contenant de la nicotine (timbre, gomme, vaporisateur nasal)

Les patients qui fument actuellement ou qui utilisent du tabac ou des produits à base de nicotine (patch, gomme ou spray nasal) courent un plus grand risque de complications chirurgicales importantes entraînant la mort de la peau, un retard de cicatrisation et des cicatrices supplémentaires. Les personnes exposées à la fumée secondaire courent également un risque potentiel de complications similaires imputables à une exposition à la nicotine. De plus, le tabagisme peut avoir un effet négatif important sur l'anesthésie et le rétablissement de l'anesthésie, avec toux et éventuellement augmentation du saignement. Les personnes qui ne sont pas exposées à la fumée de tabac ou à des produits contenant de la nicotine ont un risque significativement plus faible de ce type de complication. Veuillez indiquer votre statut actuel concernant ces éléments ci-dessous :

Je ne fume pas et n'utilise pas de produits à base de nicotine. Je comprends le risque potentiel d'exposition secondaire à la fumée entraînant des complications chirurgicales.

Je suis fumeur ou utilise des produits à base de tabac / nicotine. Je comprends le risque de complications chirurgicales de fumer ou d'utiliser des produits à base de nicotine.

Il est important de ne pas fumer au moins 6 semaines avant la chirurgie et jusqu'à ce que votre médecin vous dise qu'il est prudent de revenir, si vous le souhaitez. Je reconnais que je préviendrai mon médecin si je continue à fumer pendant ce laps de temps et je comprends que pour ma sécurité, la chirurgie, si possible, peut être retardée.

Médicaments et compléments alimentaires à base de plantes: La prise de médicaments en vente libre, à base de plantes et / ou sur ordonnance peut entraîner des effets indésirables. L'aspirine et les médicaments contenant de l'aspirine entravent la coagulation et peuvent provoquer davantage de saignements. Ceux-ci comprennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que Motrin, Advil et Aleve. Il est très important de ne pas arrêter les médicaments interférant avec les plaquettes, tels que Plavix, qui est utilisé après un stent. Si vous avez un stent et que vous prenez Plavix, il est important d'informer le chirurgien plasticien. L'arrêt de Plavix peut entraîner une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et même la mort. Assurez-vous de consulter votre médecin à propos des interactions médicamenteuses éventuelles avec les médicaments que vous prenez déjà. Si vous présentez une réaction indésirable, arrêtez immédiatement le traitement et appelez votre chirurgien plasticien pour obtenir des instructions. Si la réaction est grave, rendez-vous immédiatement à la salle d'urgence la plus proche. Lorsque vous prenez les médicaments prescrits contre la douleur après une chirurgie, sachez qu'ils peuvent affecter votre processus de réflexion et votre coordination. Ne conduisez pas, n'utilisez pas d'équipement complexe, ne prenez aucune décision importante et ne buvez pas d'alcool pendant que vous prenez ces médicaments. Assurez-vous de ne prendre vos médicaments que selon les directives.

Exposition au soleil - Salon de bronzage ou direct: Les effets du soleil sont dommageables pour la peau. L'exposition des zones traitées au soleil peut entraîner une augmentation des cicatrices, des changements de couleur et une mauvaise cicatrisation. Les patients qui bronzent, que ce soit à l'extérieur ou dans un salon, doivent en informer leur chirurgien et retarder le traitement ou éviter le bronzage jusqu'à ce que le chirurgien indique qu'il est prudent de reprendre. L'effet néfaste de l'exposition au soleil se produit même avec l'utilisation d'un écran solaire ou d'une couverture vestimentaire.

Plans de voyage: Toute opération comporte un risque de complications pouvant retarder la guérison et votre retour à la vie normale. Veuillez informer le chirurgien de tous les projets de voyage, des engagements importants déjà programmés ou planifiés, ou des contraintes de temps importantes pour vous, afin que le moment opportun de la chirurgie puisse avoir lieu. Rien ne garantit que vous soyez en mesure de reprendre toutes les activités dans les délais souhaités.

Information sur la patiente : Il est important d'informer votre chirurgien plasticien si vous utilisez des pilules contraceptives, un substitutif d'oestrogènes ou si vous croyez être enceinte. De nombreux médicaments, y compris les antibiotiques, peuvent neutraliser l'effet préventif des pilules contraceptives, permettant ainsi la conception et la grossesse.

Initiales du patient _____

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ - L'BLÉPHAROPLASTIE

Troubles mentaux et chirurgie éleative: Il est important que tous les patients qui souhaitent subir une chirurgie éleative aient des attentes réalistes, axées sur l'amélioration plutôt que sur la perfection. Des complications ou des résultats peu satisfaisants sont parfois inévitables, peuvent nécessiter une intervention chirurgicale supplémentaire et sont souvent stressants. Veuillez discuter ouvertement avec votre chirurgien, avant la chirurgie, de tout antécédent de dépression émotionnelle ou de troubles de santé mentale que vous pourriez avoir. Bien que de nombreuses personnes puissent bénéficier psychologiquement des résultats d'une chirurgie éleative, il est impossible de prédire avec précision les effets sur la santé mentale.

Résultat général de la chirurgie: Bien que de bons résultats soient attendus, il n'existe aucune garantie explicite ou implicite sur les résultats pouvant être obtenus. Vous pourriez être déçu des résultats de la chirurgie de plastie abdominale. Une cicatrice chirurgicale insatisfaisante, des déformations visibles aux extrémités des incisions (oreilles de chien), une perte de fonction, une perturbation de la plaie, une guérison insuffisante et une perte de sensation peuvent survenir. Il peut être nécessaire d'effectuer une intervention chirurgicale supplémentaire pour améliorer vos résultats.

L'OBSERVANCE DU PATIENT

Suivez toutes les instructions du médecin avec soin; c'est essentiel pour le succès de votre résultat. Il est important que les incisions chirurgicales ne soient pas soumises à une force excessive, un gonflement, une abrasion ou un mouvement pendant la période de cicatrisation. Les activités personnelles et professionnelles doivent être limitées. Les pansements de protection et les drains ne doivent pas être retirés sauf sur instructions de votre chirurgien plasticien. La réussite de la fonction postopératoire dépend à la fois de la chirurgie et des soins ultérieurs. L'activité physique qui augmente votre pouls ou votre fréquence cardiaque peut provoquer des ecchymoses, un gonflement, une accumulation de liquide et la nécessité d'une reprise de la chirurgie. Il est sage de s'abstenir de toute activité physique intime après une chirurgie jusqu'à ce que votre médecin vous dise que c'est sans danger. Il est important que vous participiez aux soins de suivi, que vous retourniez pour un suivi médical et que vous favorisiez votre rétablissement après une chirurgie.

ASSURANCE SANTÉ

La plupart des compagnies d'assurance-maladie excluent la couverture pour les opérations chirurgicales esthétiques telles que la blépharoplastie ou toute complication pouvant résulter de la chirurgie. Veuillez examiner attentivement votre brochure d'informations pour ceux qui bénéficient d'assurance maladie ou contacter votre compagnie d'assurance pour obtenir une explication détaillée de la politique suivie en matière de couverture des procédures de blépharoplastie. La plupart des régimes d'assurance ne couvrent pas les interventions chirurgicales secondaires ou de révision.

POLITIQUE DE REVISION

La chirurgie de révision chirurgicale est une partie courante de la chirurgie éleative. Votre procédure ne vous empêchera pas de vieillir, de s'affaïsser, de laisser des cicatrices ou de subir des modifications cutanées pouvant faire l'objet d'un contrôle génétique. Si la chirurgie de révision est souhaitée ou recommandée, des frais peuvent être associés. Si cela est planifié ou réalisé dans un délai d'un (1) an après la chirurgie, le médecin ne vous facturera aucun frais, mais des frais d'installation seront facturés par la clinique pour l'utilisation de la salle d'opération. Si une anesthésie est nécessaire, il y aura également des frais. La politique de révision et les rabais de courtoisie s'appliquent uniquement aux patients qui se conforment aux ordonnances et aux visites postopératoires.

CHIRURGIE SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE (RÉ-OPÉRATION)

Outre le risque et les complications chirurgicales potentielles, de nombreuses affections variables peuvent influencer sur les résultats à long terme de la chirurgie des paupières. Même si les risques et les complications sont rares, les risques cités sont ceux qui sont particulièrement associés à la blépharoplastie. D'autres complications et risques peuvent survenir mais sont encore plus rares. La pratique de la médecine et de la chirurgie n'est pas une science exacte. Bien que de bons résultats soient attendus, il n'existe aucune garantie explicite ou implicite sur les résultats pouvant être obtenus. Dans certaines situations, il peut ne pas être possible d'obtenir des résultats optimaux avec une seule intervention chirurgicale.

Initiales du patient _____

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ – LA BLÉPHAROPLASTIE

RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES

Le coût de la chirurgie implique plusieurs frais pour les services fournis. Le total inclut les honoraires facturés par votre chirurgien, le coût des fournitures chirurgicales, l'anesthésie, les frais de salle d'opération. Si le coût de la chirurgie est couvert par un régime d'assurance, vous serez responsable des co-paiements, des franchises et des frais non couverts nécessaires. Les frais facturés pour cette procédure n'incluent pas de coûts futurs potentiels pour les procédures supplémentaires que vous choisissez ou nécessitez pour réviser, optimiser ou compléter vos résultats. Des coûts supplémentaires peuvent survenir si des complications se développent suite à la chirurgie. Les frais de chirurgie secondaire ou de chirurgie d'un jour à l'hôpital associés à une chirurgie de révision seront également à votre charge.

En signant le consentement pour cette opération / procédure, vous reconnaissez que vous avez été informé de ses risques et conséquences et acceptez la responsabilité des décisions cliniques qui ont été prises ainsi que des coûts financiers de tous les traitements futurs.

- **Je comprends** que je suis responsable des frais de chirurgie qui m'ont été indiqués, ainsi que des frais supplémentaires pour les frais d'anesthésie, d'établissement et, éventuellement, de laboratoire, de radiographie et de pathologie. Les centres de consultation, les centres de consultations externes et les hôpitaux ont souvent des règles selon lesquelles certains tissus / implants retirés au cours d'une intervention chirurgicale doivent être envoyés pour évaluation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. S'il vous plaît vérifier avec votre chirurgien pour recevoir une estimation de tous les coûts supplémentaires qui pourraient vous être facturés.
- **Je comprends** qu'il y aura des frais de dépôt pour la réservation et la planification de mon intervention chirurgicale, qui fait partie des frais de chirurgie globaux.

Si je dois annuler mon opération sans motif médicalement approuvé, soumis par écrit et acceptable par la clinique, dans les deux semaines suivant l'opération prévue, je comprends que mes frais de dépôt seront perdus. Bien que cela puisse sembler être une charge pour des services qui n'ont pas été fournis, ces frais sont nécessaires pour réserver la salle d'opération et les installations en votre nom, ce qui est fait au moment de la planification.

- **Je comprends** et accepte ces conditions financières de manière inconditionnelle et irrévocable.

CLAUSE DE CONSENTEMENT

Les documents de consentement éclairé sont utilisés pour communiquer des informations sur le traitement chirurgical proposé d'une maladie ou d'une affection, ainsi que sur la divulgation des risques, ainsi que sur d'autres formes de traitement, y compris l'absence de chirurgie. Le processus de consentement éclairé tente de définir des principes de divulgation des risques qui devraient généralement répondre aux besoins de la plupart des patients dans la plupart des circonstances.

Cependant, les documents de consentement éclairé ne doivent pas être considérés comme exhaustifs dans la définition des autres méthodes de soins et des risques rencontrés. Votre chirurgien plasticien peut vous fournir des informations supplémentaires ou différentes, basées sur tous les faits de votre cas et l'état actuel des connaissances médicales.

Les documents de consentement éclairé ne sont pas destinés à définir ou à servir de norme de soins médicaux. Les normes de soins médicaux sont déterminées sur la base de tous les faits impliqués dans un cas individuel et sont sujettes à changement à mesure que les connaissances scientifiques et la technologie progressent et que les modèles de pratique évoluent.

Initiales du patient _____

CONSENTEMENT À LA CHIRURGIE

1. J'autorise par la présente le Dr Durand et les assistants choisis pour effectuer la procédure ou le traitement suivant:

LA BLÉPHAROPLASTIE : paupières supérieures : paupières inférieures :

J'ai reçu le document suivant: **CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ – LA BLÉPHAROPLASTIE**

2. Je reconnais que, au cours de l'opération et du traitement médical ou de l'anesthésie, des conditions imprévues peuvent nécessiter des procédures différentes de celles décrites ci-dessus. J'autorise donc le médecin susmentionné et ses assistants ou personnes désignées à effectuer toute autre procédure nécessaire et souhaitable dans l'exercice de son jugement professionnel. L'autorisation accordée en vertu de ce paragraphe doit inclure toutes les affections nécessitant un traitement et que mon médecin ne connaît pas au moment du début de la procédure.

3. Je consens à l'administration de tels anesthésiques jugés nécessaires ou souhaitables. Je comprends que toutes les formes d'anesthésie impliquent un risque et la possibilité de complications, de blessures et parfois de décès.

4. Je comprends ce que mon chirurgien peut et ne peut pas faire, et je comprends qu'il n'y a aucune garantie, implicite ou spécifique, concernant mon résultat. J'ai eu l'occasion d'expliquer mes objectifs et de comprendre quels résultats souhaités sont réalistes et ceux qui ne le sont pas. On a répondu à toutes mes questions et je comprends les risques inhérents (spécifiques) des procédures que je recherche, ainsi que les risques et complications supplémentaires, les avantages et les solutions de rechange. Comprenant tout cela, j'ai choisi de procéder.

5. Je consens à être photographié ou télévisé avant, pendant et après la ou les opérations ou procédures à exécuter, y compris les parties appropriées de mon corps, à des fins médicales, scientifiques ou éducatives, à condition que mon identité ne soit pas révélée par les images.

6. Je comprends que les honoraires du chirurgien sont distincts des frais d'anesthésie et d'hospitalisation et que ces honoraires me conviennent. Si une procédure secondaire est nécessaire, des dépenses supplémentaires seront nécessaires.

7. Je me rends compte que ne pas avoir l'opération est une option.

8. Il m'a été expliqué que j'ai compris:

- LE TRAITEMENT OU LA PROCÉDURE CI-DESSUS À ÊTRE ENTREPRIS

- IL PEUT Y AVOIR DES PROCÉDURES OU MÉTHODES DE TRAITEMENT ALTERNATIVES

- IL EXISTE DES RISQUES POUR LA PROCÉDURE OU LE TRAITEMENT PROPOSÉ

Je consens au traitement ou à la procédure et aux éléments énumérés ci-dessus (1-8) et je suis satisfait de l'explication.

Date : _____

Signature Patient ou personne autorisée à signer pour le patient

Témoïn _____